

Vogelbeobachtungen am Unteren Inn

26. Juli – 05. August 2017

Beobachtete Arten

Art	Beobacht.	Max. Ind.	Gebiete
Graugans	7	ca. 400	3,6,7,10,11
Höckerschwan	6	17	6,7,8,9,11
Nilgans	1	1	6
Rostgans	2	2	6
Brandgans	4	2	6,7
Stockente	8	ca. 130	6,7,8,9,11
Krickente	3	2	6
Kolbenente	1	1	9
Reiherente	1	1	6
Fasan	2	1	6,10
Zwergtaucher	1	1	9
Haubentaucher	2	1	6,11
Kormoran	1	1	3
Graureiher	5	5	3,6,11
Silberreiher	4	3	6,7,10
Seidenreiher	11	6	3,4,6,7,9,10,11
Nachtreiher	4	8	1,2,3,4
Wespenbussard	1	1	6
Seeadler	1	1	11
Schlangenadler	1	1	3
Rohrweihe	3	2	3,4,6
Mäusebussard	2	1	9,11
Turmfalke	3	1	6
Blässhuhn	3	7	3,9,11
Kiebitz	6	ca. 100	6,10,11
Flussregenpfeifer	2	5	6
Flussuferläufer	7	8	5,6,7,10
Waldwasserläufer	1	1	6
Grünschenkel	4	6	6,7
Bruchwasserläufer	2	1	6
Großer Brachvogel	4	ca. 100	6,10,11
Alpenstrandläufer	2	2	6
Sichelstrandläufer	1	1	6
Lachmöwe	7	ca. 50	3,6,9
Schwarzkopfmöwe	1	1	6
Mittelmeermöwe	9	ca. 250	3,5,6,7,8,10
Flusseeschwalbe	2	2	7,9
Ringeltaube	4	3	3,6,11
Türkentaube	5	5	1
Eisvogel	2	1	10
Buntspecht	3	1	3,6,8
Schwarzspecht	1	1	10
Grünspecht	1	1	3
Neuntöter	1	3	2
Pirol	4	2	4,6
Eichelhäher	1	1	6
Dohle	1	ca. 50	11
Rabenkrähe	4	7	6,9
Rauchschwalbe	7	ca. 50	1,3,6,9,11
Mehlschwalbe	3	> 5	1,3,6

Art	Beobacht.	Max. Ind.	Gebiete
Kohlmeise	7	4	3,6,8,9,11
Blaumeise	3	2	6,9,11
Kleiber	1	1	11
Zaunkönig	1	1	3
Zilpzalp	5	2	6,8,9,11
Mönchsgrasmücke	5	2	3,6,11
Grauschnäpper	1	2	9
Hausrotschwanz	2	1	3,8
Amsel	4	2	1,3,6,11
Singdrossel	1	1	6
Bachstelze	3	6	3,6,8
Goldammer	1	1	3
Buchfink	2	2	6,11
Grünfink	2	3	6
Stieglitz	1	2	3
Hausperling	7	> 10	1,3
Feldsperling	2	ca. 10	6

Erklärung

Beobacht = Anzahl der Beobachtungen der Art

Max. Ind. = Maximale Anzahl der Individuen pro Beobachtung

Gebiete:

- 1 Eggfing (Ort)
- 2 Auwald Eggfing
- 3 Eggfing / Stausee
- 4 Minaberg: Aussichtspunkt
- 5 Reichersberg: Auwald / Inn
- 6 Inn: Katzenbergleithen <> Obernberg
- 7 Inn: Beobachtungsum Kirchdorf
- 8 Inn: Sportplatz Kirchberg
- 9 Beobachtungsturm Eglsee
- 10 Staustufe Ering / Auwald
- 11 Inn: Hagenauer Bucht

Top 12 nach Anzahl der Beobachtungen der Art

Art	Beobacht.	Max. Ind.	Gebiete
Seidenreiher	11	6	3,4,6,7,9,10,11
Mittelmeermöwe	9	ca. 250	3,5,6,7,8,10
Stockente	8	ca. 130	6,7,8,9,11
Graugans	7	ca. 400	3,6,7,10,11
Flussuferläufer	7	8	5,6,7,10
Lachmöwe	7	ca. 50	3,6,9
Rauchschwalbe	7	ca. 50	1,3,6,9,11
Kohlmeise	7	4	3,6,8,9,11
Hausperling	7	> 10	1,3
Höckerschwan	6	17	6,7,8,9,11
Kiebitz	6	ca. 100	6,10,11
Graureiher	5	5	3,6,11

Top 12 nach Maximale Anzahl der Individuen pro Beobachtung

Art	Beobacht.	Max. Ind.	Gebiete
Graugans	7	ca. 400	3,6,7,10,11
Mittelmeermöwe	9	ca. 250	3,5,6,7,8,10
Stockente	8	ca. 130	6,7,8,9,11
Kiebitz	6	ca. 100	6,10,11
Großer Brachvogel	4	ca. 100	6,10,11
Lachmöwe	7	ca. 50	3,6,9
Dohle	1	ca. 50	11
Rauchschwalbe	7	ca. 50	1,3,6,9,11
Höckerschwan	6	17	6,7,8,9,11
Haus Sperling	7	> 10	1,3
Feldsperling	2	ca. 10	6
Nachtreiher	4	8	1,2,3,4

Besonderheiten


Art	Beobacht.	Max. Ind.	Gebiete
Mittelmeermöwe	9	ca. 250	3,5,6,7,8,10
Großer Brachvogel	4	ca. 100	6,10,11
Nachtreiher	4	8	1,2,3,4
Seidenreiher	11	6	3,4,6,7,9,10,11
Rostgans	2	2	6
Pirol	4	2	4,6
Kolbenente	1	1	9
Wespenbussard	1	1	6
Seeadler	1	1	11
Schlangenadler	1	1	3
Schwarzkopfmöwe	1	1	6
Eisvogel	2	1	10

Bemerkungen

Überraschend war die relativ hohe Zahl von Seiden- und Nachtreiher (für einen hessischen Beobachter).

Allgegenwärtig am Inn war der Seidenreiher; Nachtreiher ließen sich besonders gut am Aussichtspunkt bei Minaberg (4) beobachten, aber selbst den Ort Eggfling (1) überflogen diese Vögel laut rufend in der Abenddämmerung.

Ein ausgezeichnetes Beobachtungsgebiet war Inn zwischen Katzenbergleithen und Obernberg (6) auf der österreichischen Flussseite. Hier sang trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit der Pirol seine flötenden Strophen, aber auch Limikolen, Gänse und Möwen waren hier sehr schön zu beobachten. Der Tipp eines einheimischen Ornithologen führte uns zur Hagenauer Bucht (11), wo wir durch die Rufe erregter Graugänse auf den hier brütenden Seeadler aufmerksam wurden, der für kurze Zeit über den Inseln im Inn zu sehen war. Das absolute Highlight war die Sichtung eines Schlangenadlers, der westlich des Kraftwerks Eggfling-Obernberg den Stausee (3) von Süden nach Norden überquerte und nach Nordwesten weiterzog.



Beobachtungspunkte 1 – 8



Beobachtungspunkte 9 – 11

Literatur:

Vögel beobachten in Süddeutschland (S.145 – 151)

Der Kosmos Vogelführer

Moning, Wagner

Svensson, Grant, Mullnarney, Zetterström

Marianne & Winfried Kräling